

BOLLETTINO OLIVICOLO

Fase fenologica: da ingrossamento frutti ad inizio invaiatura.

Difesa fitosanitaria

MOSCA DELL'OLIVO: tutta la zona della Valtinesi e basso Garda, per chi non avesse ancora effettuato il trattamento come consigliato nei precedenti bollettini o nel caso siano già trascorsi 20 giorni dal precedente trattamento, si consiglia di intervenire nei prossimi giorni con prodotto a base di Dimetoato. Considerato l'andamento a macchia di leopardo si consiglia di verificare prima dell'intervento la presenza sulle drupe di punture fertili.

Zona ALTO GARDA

Dove si effettua la lotta adulticida mediante la cattura massale con trappole si consiglia di effettuare il campionamento delle drupe e, solo nel caso di superamento della soglia del 10-15% di danno si consiglia di intervenire con prodotto a base di Dimetoato.

Zona del SEBINO


Nei comuni della fascia a lago si consiglia, se non ancora eseguito, l'intervento nei prossimi giorni con prodotto a base di Dimetoato.

Zona FRANCIACORTA

Al momento si consiglia di intervenire nel comune di Erbusco dove dai rilievi si segnala il superamento della soglia di intervento.

E' buona norma effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata, bagnando attentamente l'intera chioma. Con atomizzatori utilizzare volumi d'acqua normali. Si ricorda inoltre di prestare particolare attenzione a fenomeni di deriva negli oliveti posti in vicinanza di vigneti con uve prossime alla raccolta.

Punture da mosca
dell'olivo



OPERAZIONI COLTURALI

Si consiglia di non effettuare nessuna operazioni colturale.

Se si desidera avere informazioni tecniche più dettagliate, contattare i tecnici AIPOL e CVP al numero 030-3757880.