



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

ZONA LARIO - BOLLETTINO OLIVO del 07-05-2010

Fase fenologica: ripresa vegetativa

Interventi colturali:

POTATURA

Si possono ancora eseguire le operazioni di potatura in tutta l'area lariana, visto il ritardo nella ripresa vegetativa.

Terminata la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti a base di rame, seguendo i dosaggi riportati in etichetta, per disinfettare i tagli e prevenire le infezioni di Occhio di Pavone e di Piombatura.

Nel caso di presenza di rogna, si consiglia di intervenire immediatamente dopo la potatura.

Nelle aree più umide, particolarmente soggette ad attacchi di Cicloconio (occhio di pavone) e di Piombatura, si può eseguire un trattamento con Dodina, in alternativa a quello rameico.

CONCIMAZIONE AZOTATA DI PRODUZIONE:

in questo periodo si può intervenire con la concimazione azotata come riportato nel precedente bollettino zona Lario del 9 aprile 2010.

CONCIMAZIONE AZOTATA D'ALLEVAMENTO:

Vedi precedente bollettino zona Lario del 9 aprile 2010.

Tenendo presente le indicazioni fornite, si consiglia comunque di non superare complessivamente le 80 unità di azoto/ettaro, pari a circa 170 Kg di urea/ettaro.

Inoltre, come già ricordato in precedenza, i dosaggi indicati sono da realizzarsi solo se la pianta è sana, si sviluppa correttamente e se si mette in atto un piano di difesa dalle infezioni fungine; nel caso si presentassero sintomi di patologie fungine o attacchi da cocciniglia, in parallelo alla cura dalle infezioni, andranno ridotti i dosaggi di azoto, fino ad azzerarli nei casi più gravi.