



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

ZONA LARIO - BOLLETTINO OLIVO del 19-01-2010

Fase fenologica: riposo vegetativo

POTATURA: dato che si riscontrano ancora temperature basse su tutta l'area lariana, si sconsiglia di iniziare le operazioni di potatura per non accentuare la sensibilità delle piante a possibili danni da gelo.

CONCIMAZIONE: in questo periodo si può intervenire con la concimazione invernale fosfo-potassica. Premesso che per una concimazione equilibrata sarebbe necessario eseguire l'analisi del suolo, si danno comunque alcune indicazioni di massima sulle concimazioni del periodo invernale.

Le somministrazioni organiche non sono necessarie tutti gli anni ma possono essere eseguite una volta ogni 2-3 anni, a seconda del contenuto in sostanza organica del terreno.

La concimazione organica può essere eseguita con letame (200/300 quintali a ettaro ogni triennio) oppure con pollina (100 quintali a ettaro ogni triennio). Ridurre le dosi se si interviene ad anni alterni.

Con la Concimazione chimica fosfo-potassica si possono distribuire fino a 100 Kg. /ha/anno di Perfosfato triplo e fino a 120 kg./ettaro/anno di solfato di potassio.

SEDE OPERATIVA Viale della Bornata, 110 - 25123 Brescia

SEDE LEGALE Via S. Zeno, 69 - 25124 Brescia

Tel 030/3757880 Fax 030/3375899

e-mail aipol@libero.it – www.cetrovitivinicolo provinciale.it/aipol